

ENGRAIS AZOTES 2022

L'élément azote est l'un des constituants des acides aminés et des protéines ainsi que de la chlorophylle qui contrôle la photosynthèse.

Les plantes doivent s'alimenter en azote à partir du sol car le [diazote](#) atmosphérique n'est pas, en général, assimilé directement par les plantes (sauf par les légumineuses). L'azote présent dans les sols sous forme d'ions nitrate (NO_3^-) est directement assimilable (effet rapide) mais il est facilement entraîné, par les eaux de pluie, par lessivage. Par contre l'azote sous forme d'ions ammonium (NH_4^+) qui se lie électrostatiquement aux argiles du sol, chargées négativement, est fixé dans le sol. Pour être assimilable par les plantes (sauf pour le riz dont la plante peut assimiler directement l'ion ammonium) l'ion ammonium doit être préalablement oxydé en ion NO_3^- par des bactéries (nitrosomas, nitrobacter) contenues dans le sol, en présence du [dioxygène](#) de l'air (effet retard).

Dans les plantes, l'ion nitrate est transféré aux feuilles où, en présence de nitrate réductase, il est réduit en ion ammonium et métabolisé en ion amide NH_2^- , qui conduit à la formation des acides aminés.

L'humus a une teneur de 5 % en azote organique en grande partie non assimilable. Chaque année, 1 à 2 % de cet azote (soit 40 à 80 kg de N/ha/an) passe à l'état NO_3^- , c'est la minéralisation. Une partie du NO_3^- présent dans l'humus (soit environ 30 kg de N/ha/an) est transformé par des microbes anaérobies en NO_2^- et N_2 (c'est la dénitrification).

Les besoins en N, par hectare, pour une production de blé de 70 quintaux sont, en moyenne, de 250 kg. Seuls, 210 kg sont consommés, car il y a, en particulier, 20 kg de dénitrification. Sur cette consommation, 155 kg proviennent des engrais, 65 kg d'azote organique, 30 kg d'apports naturels (pluies...).

Fixation du diazote de l'air par les plantes : d'après La Recherche, n°199, mai 1988.

Quelques plantes (fougère Azolla en Asie, légumineuse Sesbania Rostrata en Afrique) en association avec des micro-organismes (bactéries du genre Rhizobium) pour S. Rostrata peuvent fixer le diazote de l'air et être utilisées comme "engrais vert" pour la culture du riz. A l'échelle mondiale on estime que 75 millions de t de N_2 sont ainsi accumulées soit l'équivalent de 160 millions de t d'engrais chimiques. S. Rostrata peut fixer 200 à 300 kg de N_2 par ha en 50 jours et permet de faire passer le rendement en riz de 2 à 4 t/ha ce qui équivaut à un apport d'engrais chimiques de 60 à 80 kg.


Le trèfle fixe 150 kg de N/hectare/an, la luzerne 180 kg de N/ha/an.

Matières premières

Le [gaz naturel](#) fournit, en 2015, dans le monde, 69 % de l'[ammoniac](#) nécessaire à la fabrication des engrais azotés. Le [charbon](#) et le gaz de cokerie comptent pour 29 % (à 95 % en Chine), le fuel ou le naphtha pour 2 %.

Fabrication industrielle

Elle nécessite la production d'ammoniac (voir les chapitres consacrés au [dihydrogène](#) et à l'[ammoniac](#)) lui même obtenu par production de dihydrogène obtenu principalement par reformage à la vapeur d'eau du méthane du gaz naturel puis conversion du monoxyde de carbone selon les équations suivantes :



Le [dioxyde de carbone](#) est récupéré si de l'urée est fabriquée.


L'ammoniac est ensuite obtenu par synthèse catalytique avec un catalyseur à base de fer, le [diazote](#) (de l'air) étant introduit lors de la fabrication du dihydrogène. Environ 82 % de l'ammoniac produit dans le monde est utilisé pour la fabrication d'engrais.

Composés chimiques fabriqués

Les produits suivants sont utilisés comme engrais azotés :

Ammoniac : NH_3 . Il est employé sous forme de gaz liquéfié sous pression injecté dans le sol. Cette utilisation directe de l'ammoniac est surtout pratiquée aux États-Unis où elle représente, en 2020, 25 % de la fertilisation azotée. Elle n'est pas employée en France.

Urée : $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. Elle est obtenue par action du [dioxyde de carbone](#) issu du reformage, sur l'[ammoniac](#), sous pression (140 à 250 bar), à 190°C (environ 35 % l'ammoniac produit dans le monde est utilisé pour fabriquer de l'urée). Il se forme du carbamate d'ammonium, $\text{NH}_2\text{-CO}_2\text{-NH}_4$, qui est déshydraté en urée. Les unités de production ont des capacités de 1 000 à 2 000 t/jour. C'est l'engrais azoté le plus riche en N avec une teneur de 46 %. Son action a lieu par hydrolyse lente et formation d'ammoniac selon l'équation suivante :



En France, l'urée est utilisée (surtout dans le Sud-Ouest et en Alsace, régions productrices de maïs) seule ou en solutions 50/50 avec NH_4NO_3 . C'est le principal engrais azoté utilisé dans le monde. Elle convient aux pays tropicaux (les ammonitrates sont trop solubles) en particulier pour la culture du riz mais aussi aux régions froides ou tempérées, sauf dans les sols sablonneux ou très calcaires. 90 % de l'urée est destinée à la production d'engrais. Les 10 % restants sont utilisés pour fabriquer des colles urée-[formol](#), de la mélamine, des dérivés isocyanuriques, dans l'alimentation animale, l'extraction des paraffines...

La production mondiale est, en 2020, comptée en N, de 83,5 millions de t. Elle fait l'objet d'un important commerce international, avec 23,9 millions de t de N, en 2020.

Nitrate d'ammonium (dénommé ammonitrate) : NH_4NO_3 . Il est préparé, à 160°C, sous 3 bar, par neutralisation de l'[acide nitrique](#) par l'[ammoniac](#). L'acide nitrique est lui-même préparé par oxydation catalytique de l'ammoniac sur grilles de [platine](#) (voir le chapitre consacré à [HNO₃](#)). Les unités de production ont des capacités de 1 500 à 3 000 t/jour.

Le titre en N (35 % maximum) varie à l'aide d'une charge, en général [calcaire](#). Du nitrate de magnésium (1,6 %) est ajouté pour stabiliser NH_4NO_3 sous sa forme orthorhombique IV

(changement de forme à 32°C) et éviter la désagrégation des granulés, puis la prise en masse qui augmente les risques de détonation.

Le nitrate d'ammonium est utilisé dans la fabrication d'engrais sous forme d'engrais NP, NPK, de solutions urée-nitrate et surtout solide comme engrais simple, dénommé ammonitrate. C'est l'engrais azoté le plus utilisé en France, où il représente, en 2017-18, 36 % de la fertilisation azotée.

En 2020, la production mondiale, comptée en N, est de 17,3 millions de t. Une partie de la production est employée en utilisation directe comme engrais, une autre partie pour préparer des solutions d'engrais et enfin une dernière partie dans des applications industrielles, en dehors de l'industrie de engrais, comme, par exemple, l'industrie de explosifs. Le commerce international a porté sur 3,2 millions de t, comptées en N.

Sulfate d'ammonium : $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. C'est un sous-produit des fabrications de caprolactame, acrylonitrile, [coke](#) sidérurgique mais il est également synthétisé à partir d'[ammoniac](#) et d'[acide sulfurique](#). En 2020, la production mondiale est de 5,9 millions de t comptées en N et le commerce international de 3,1 millions de t, comptées en N.

Phosphates d'ammonium (engrais binaire NP) : diammonique (DAP) : $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ et monoammonique (MAP) : $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$. Ils sont obtenus par neutralisation de NH_3 par [\$\text{H}_3\text{PO}_4\$](#) (voir les [engrais phosphatés](#)). La production mondiale de phosphate diammonique est, en 2020, de 6,4 millions de t comptées en N, celle de phosphate monoammonique de 3,6 millions de t comptées en N.

Divers : nitrate de sodium naturel du Chili, cyanamide calcique (CaCN_2), nitrate de potassium (engrais binaire NK, par attaque à l'[acide nitrique](#) de [KCl](#)), chlorure d'ammonium (utilisé surtout en riziculture au Japon et en Inde), hydrogénocarbonate d'ammonium (utilisé en Chine), nitrate de calcium et d'ammonium.

Une partie de la production d'engrais azotés est commercialisée sous forme de solutions urée - nitrate d'ammonium.

Évolution de la production d'engrais azotés au cours des XIX et XX^{ème} siècle.

en milliers de t de N

Années	Nitrate du Chili	Guano	Sulfate d'ammonium sous produit de la distillation du charbon	Cyanamide calcique	Ammoniac synthétique	Total
1850	5	-	0	0	0	5
1860	10	70	0	0	0	80
1880	50	30	0	0	0	80
1900	220	20	120	0	0	360
1920	410	10	290	70	150	950
1940	200	10	450	290	2 150	3 100
1960	200	-	950	300	9 540	10 990
1980	90	-	970	250	59 290	60 600
2000	120	-	370	80	85 130	85 700


Source : EFMA

Le nitrate de sodium du Chili est exploité depuis 1804 dans le désert d'Atacama situé initialement dans 3 pays : Chili, Pérou et Bolivie. Il contient de 1 à 5 % de N. Il est extrait par lixiviation à l'eau chaude. Après la guerre du salpêtre (1879-1884), le Chili a annexé le gisement.

Le guano, formé par les déjections d'oiseaux, s'est accumulé (jusqu'à 60 m d'épaisseur) par exemple sur un ensemble d'îles au large des côtes péruviennes. Sa teneur est de 14 % de N et 14 % de P₂O₅.

Le sulfate d'ammonium était initialement produit lors de la fabrication du [gaz manufacturé](#) (ou gaz à l'eau) utilisé comme gaz de ville ou d'éclairage. Ce gaz contient de 0,7 à 1,5 % d'ammoniac qui est précipitée en sulfate d'ammonium. Actuellement, il est récupéré lors de l'élaboration du [coke](#).

La cyanamide calcique est fabriquée par réaction du carbure de calcium avec le [diazote](#) de l'air, vers 1100°C, selon l'équation suivante :



Productions

Dans le monde, en 2021 : 118,548 millions de t de N.

en milliers de t de N			
Chine	28 140	Canada	3 746
Inde	13 870	Égypte	3 606
États-Unis	12 678	Pakistan	3 370
Russie	11 403	Arabie Saoudite	2 998
Indonésie	4 219	Qatar	2 591

Source : FAO

La production de l'Union européenne, en 2021, est de 10,310 millions de t de N.

Principaux pays exportateurs : en 2021, sur un total de 45,978 millions de t de N dont 8,959 millions de t de N pour l'Union européenne.

en milliers de t de N			
Russie	7 228	Égypte	1 270
Chine	7 076	États-Unis	1 260
Qatar	2 353	Belgique	1 088
Arabie Saoudite	2 152	Malaisie	946
Pays Bas	2 051	Lituanie	885

Source : FAO

Principaux pays importateurs : en 2021, sur un total de 48,526 millions de t de N dont 10,344 millions de t de N pour l'Union européenne.

en milliers de t de N			
Brésil	6 715	Turquie	1 506
Inde	5 017	Thaïlande	1 466
États-Unis	4 664	Argentine	1 257
France	1 877	Allemagne	937
Australie	1 741	Espagne	851

Source : FAO

Situation française

En t de N.

Production, en 2019 : 512 493 t de N.

Commerce extérieur : en 2022, en t de N.

Ammonitrates sous toutes formes y compris en présence de carbonate de calcium, hors solutions avec l'urée :

- Exportations : 140 046 t vers l'Allemagne à 34 %, le Royaume Uni à 15 %, l'Irlande à 11 %, la Lituanie à 5 %, la Suède à 5 %.
- Importations : 290 774 t de Belgique à 51 %, des Pays Bas à 19 %, d'Espagne à 16 %, de Lituanie à 5 %.

Sulfate d'ammonium :

- Exportations : 17 670 t vers la Pologne à 37 %, l'Allemagne à 34 %, la Belgique à 14 %, l'Espagne à 5 %.
- Importations : 148 291 t de Belgique à 34 %, des Pays Bas à 29 %, de Chine à 11 %, d'Espagne à 10 %, d'Allemagne à 10 %.

Urée sous toutes formes, hors solutions avec le nitrate d'ammonium :

- Exportations : 85 450 t vers le Royaume Uni à 38 %, l'Espagne à 27 %, l'Italie à 11 %, la Belgique à 7 %.
- Importations : 821 605 t d'Égypte à 31 %, d'Algérie à 24 %, de Russie à 10 %, de Belgique à 8 %, d'Allemagne à 6 %.

Solutions urée - nitrate d'ammonium :

- Exportations : 6 089 t vers le Danemark à 63%, l'Espagne à 30 %, la Suisse à 4 %.
- Importations : 613 340 t des États-Unis à 35 %, de Trinidad et Tobago à 24 %, des Pays Bas à 15 %, de Russie à 12 %, de Lituanie à 7 %.

Consommation, en 2020-21 : 1,766 million de t de N dont :

- Simples : 1 577 milliers de t de N (5 375 milliers de t de produit).
- NK et NPK : 137 milliers de t de N (988 milliers de t de produits).
- DAP-MAP : 52 milliers de t de N (288 milliers de t de produits).

Consommation à l'hectare : 77 kg de N, en 2019-20.

Utilisations

Consommations par produits :

Engrais	en milliers de t de N					
	Monde 1973-74	Monde 2019	Chine, en 2019	Inde, en 2019	États-Unis, en 2019	France, en 2019
Urée	8 330	52 259	8 490	15 429	2 839	382
Ammonitrate	7 300	6 505	0	0	206	557
Phosphates d'ammonium	1 023	7 624	1 621	1 816	689	58
Ammoniac	3 580	3 603	0	0	2 848	0

Solutions	2 120	6 210	4	0	3 064	628
Sulfate d'ammonium	2 760	3 896	62	138	351	9
Ternaires NPK	6 100	18 100	12 499	634	743	84
Total	39 220	107 550	24 109	19 101	11 729	2 126

Source : IFA

Consommation par pays : en 2020. Monde : 113,292 millions de t de N, Union européenne : 9,812 millions de t de N.

en milliers de t de N

Chine	25 885	Canada	3 083
Inde	20 204	France	2 078
États-Unis	11 621	Turquie	2 053
Brésil	5 911	Russie	1 916
Indonésie	3 541	Vietnam	1 814
Pakistan	3 534	Thaïlande	1 472

Source : FAO

Problèmes

Sécurité : le nitrate d'ammonium est un composé qui dans certaines conditions peut exploser. En effet, le mélange de NH_4NO_3 avec 6 % de fuel est l'explosif industriel le plus utilisé, l'amorçage étant réalisé avec de la dynamite. Par ailleurs, au-dessus de 195°C , NH_4NO_3 risque de se décomposer avec explosion.

- Le 21 septembre 1921, dans l'usine BASF d'Oppau, en Allemagne, l'explosion de 5 400 t de sel double $\text{NH}_4\text{NO}_3\text{-(NH}_4)_2\text{SO}_4$ a fait de 500 à 600 morts.
- Le 16 avril 1947, l'explosion de 2 bateaux à Texas City a fait 561 morts puis, plus tard, d'un bateau à Brest, 22 morts : les granulés de NH_4NO_3 étaient enrobés de 1 % de cire combustible.
- Du nitrate d'ammonium a été utilisé lors de l'attentat d'Oklahoma City, aux États-Unis, le 19 avril 1995 qui a fait 167 morts.
- Le 21 septembre 2001, à 10h17, 300 à 400 t de nitrate d'ammonium ont explosé à l'usine AZF de Toulouse entraînant la destruction de l'usine, la mort de 30 personnes (22 dans l'usine et 8 à l'extérieur) et plus de 2 000 blessés.
- Le 4 août 2020, explosion dans le port de Beyrouth de 2 750 t de nitrate d'ammonium avec plus de 200 morts.

Économiques : le prix de revient des engrais azotés est lié au coût du [gaz naturel](#) (50 % du prix de revient des ammonitrates). Les pays producteurs de gaz naturel (Pays du Golfe, Russie) ont développé une industrie de l'ammoniac extrêmement concurrentielle.

Écologiques : les ions nitrates peuvent entraîner une [pollution des eaux](#), voir le chapitre consacré à l'[eau](#).